

Bekannte Erstnachweise von nicht-einheimischen Arten in deutschen Küstengewässern (seit 2011, Stand August 2018)

2011

- Pseudodiaptomus marinus***
(Copepoda, Ruderfüßer) 2011, im Plankton vor Borkum
Quelle: Jha et al. 2013
- Synidothea laticauda***
(Isopoda, Asseln) 2011, im Weserästuar
Quelle: KÜFOG, pers. Mitt. A. Krumwiede
Spätere Nachweise: 2014, 2015 Brunsbüttel
Quelle: Geomar, pers. Mitt. G. Bock
Bemerkungen: Die Assel wurde zunächst fehlbestimmt und in Belgien und Frankreich als *S. laevidorsalis* gemeldet.
Literatur: Poore 1996, Soors et al. 2010
- Fenestrulina delicia***
(Bryozoa, Moostierchen) 2011, Tiefe Rinne bei Helgoland
Quelle: De Blauwe et al. 2014
- Schizobrachiella verrilli***
(Bryozoa, Moostierchen) 2011, Tiefe Rinne bei Helgoland
Quelle: Kind et al. 2015
- Smittoidea prolifica***
(Bryozoa, Moostierchen) 2011, Tiefe Rinne bei Helgoland
Quelle: Phycomarin, pers. Mitt. Kuhlenkamp & Kind
Lackschewitz et al. 2015
Spätere Nachweise: 2014, Wilhelmshaven
Quelle: Markert et al. 2015
- Botrylloides violaceus***
(Tunicata, Manteltiere) 2011, Helgoland
Quelle: Groepler 2012
Spätere Nachweise: 2012, 2013 Hörnum/Sylt und Wyk/Föhr,
Wilhelmshaven 2015
Quelle: Lackschewitz et al. 2015, W'haven: AWI, Lackschewitz

2012

- Antithamnionella spirographidis***
(Rhodophyta, Rotalgen) 2012, Hörnum/Sylt
Quelle: Lackschewitz et al. 2015
Spätere Nachweise: 2015 Wilhelmshaven
Quelle: AWI, Lackschewitz eig. Beob.

2013

Rangia cuneata
(Bivalvia, Muscheln)

2013, Brunsbüttel (NOK); 2014, Trave
Quelle: Bock et al. 2015

Pileolaria berkeleyana
(Polychaeta, Vielborster)

2013, Sublitoral von Helgoland
Quelle: Phycomarin, pers. Mitt. Kind & Kuhlenkamp

Paramysis lacustris
(Mysidacea, Schwebgarnelen)

2013, Oderhaff bei Kamminke (Usedom)
Quelle: Zettler 2015

2014

Dreissena bugensis
(Bivalvia, Muscheln)

2014, Oderhaff
Quelle: Meßner & Zettler 2015
Bemerkungen: Die Art kommt bereits seit 2007 in deutschen Binnengewässern vor

Hypania invalida
(Polychaeta, Vielborster)

2014, Oderhaff/Ueckermünde
Quelle: Monitoring WRRL (LUNG)
Bemerkungen: Die Art kommt seit längerem in deutschen Binnengewässern vor.

Polydora c.f. websteri
(Polychaeta, Vielborster)

2014, List/ Sylt
Quelle: AWI, pers. Mitt./eig. Beob. O. Kapoun, D. Lackschewitz

Echinogammarus trichiatus
(Amphipoda, Flohkrebse)

2014, Oderhaff bei Kamminke (Usedom)
Quelle: Zettler 2015
Bemerkungen: Die Art kommt schon seit den 1990er Jahren in deutschen Binnengewässern vor.

Arachnidium lacourti
(Bryozoa, Moostierchen)

2014, Jade Weser Port (Nds.), (als *A. c.f. lacourti*)
Quelle: Rhode et al. 2015
Spätere Nachweise: 2015, Husum (Best. bestätigt durch M.Faasse)
Quelle: Geomar, pers. Mitt. C. Lieberum

Streblospio benedicti
(Polychaeta, Vielborster)

2014, Jade Weser Port und W'haven Marinehafen
Quelle: Rhode et al. 2015 (Bestätigung etwas zweifelhaft)
Bemerkungen: auch in der RA Untersuchung des IfAÖ, November 2015 am Jade Weser Port gefunden (Bestätigung auf Nachfrage durch A. Dietrich und T. Hager des IfAÖ)

Neodexiospira brasiliensis
(Polychaeta, Vielborster)

2014, Helgoland
Quelle: Phycomarin, pers. Mitt. Kind & Kuhlenkamp (08.2016)
(Syn. *Janua brasiliensis*)

Blackfordia virginica
(Hydrozoa, Qualle)

2014, NOK
Quelle: Jaspers et al. 2018
Bemerkungen: ab 2017 in der Kieler Förde, 2018 mglw. im Vitter Bodden (Rügen)

2015

Dasysiphonia japonica
(Rhodophyta, Rotalgen)

2015, List/ Sylt, kurz darauf auch Helgoland
Quelle: AWI, D. Lackschewitz, Phycomarin, pers. Mitt. R. Kuhlenkamp

Bemerkungen: in der Literatur i. allg. unter dem älteren Namen *Heterosiphonia japonica*

Oithona davisae
(Copepoda, Ruderfüßer)

Der Copepode kommt seit spätestens 2008 in der Nordsee vor, Erstnachweis wurde aber erst 2015 publiziert.

Quelle: Cornils & Wend-Heckmann 2015)

Grandidierella japonica
(Amphipoda, Flohkrebse)

2015, Wismar

Quelle: WFD Monitoring (Zettler & Zettler 2017)

2016

Boccardia proboscidea
(Polychaeta, Vielborster)

2016, Helgoland

Quelle: Phycomarin, pers. Mitt. Kind & Kuhlenkamp

Undaria pinnatifida
(Phaeophyta, Braunalgen)

2016, Hörnum, Sylt

Quelle: AWI, eRAS

Monocorophium uenoi
(Amphipoda, Flohkrebse)

2016, Benersiel

Quelle: Nestler, eRAS

Corella eumyota
(Tunicata, Manteltiere)

2016, Jade-Weser-Port

Quelle: Nestler, eRAS

Didemnum vexillum
(Tunicata, Manteltiere)

2016, Hörnum, Sylt

Quelle: AWI, eRAS

Haminoea solitaria
(Gastropoda, Schnecken)

2016, Wismar

Quelle: Uni Rostock, pers. Mitt. Dr. Wranik

2017

Colpomenia peregrina
(Phaeophyta, Braunalgen)

2017, Helgoland

Quelle: Dieter Hanelt

Phyllodocidae spec.
(Polychaeta, Vielborster)

2017, Wesermündung

Quelle: BioConsult, pers. Mitt.